

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百六十一

詳校官太醫院吏目臣吳尊斐

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱圻

謄錄監生臣汪緣

欽定四庫全書

普濟方卷三百六十一 明 周王朱橚 撰

嬰孩初生門

胎寒附論

凡小兒胎中受寒於臟傷動胞胎生下不能將護再傷外風其候面色青白四肢逆冷手足顫動似大人寒瘧或口噤不開乃胎寒之候也其寒氣或乘虛而入臟則令腹疼或作盤腸內疝皆因寒而得之大便青者是也

方

調中九

出聖惠方

治小兒胎寒虛脹滿不嗜食大便青挾白

膿及欲發癰宜服

當歸

半兩判微炒

川椒

一分去目及閉口者微炒去汗

附子

一枝炮裂去皮臍

狼毒

半兩炒黃

巴豆

二十枚去皮心去油盡

細辛

一分

豉

四合炒微焦

杏

仁

十二枚湯浸去皮尖炒黃

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵以器盛之未滿百日兒以溫水下一丸如麻子大一二歲兒服二丸量

兒大小以意加減服之以利為度

當歸散

出聖惠方

治小兒胎寒聚唾弄舌夜啼反張怒驚

當歸

剉微炒

黃耆

剉蜜炙

細辛

黃芩

龍骨

細研

桂心

赤芍藥

各半兩

右搗羅為末每服以乳汁調下一字日三服更看兒

大小以意加減醫方集成治小兒胎中受寒生下再

感外風面青白四肢厥冷大便青黑及腸疼盤腸內

疳並皆治之

川白薑散

出直指方

治產婦取冷大過胎中受寒令兒腹痛

不飲乳

木香

陳皮

檳榔

官桂

川薑

甘草

炙各等分

右剉每服一捻水一合煎以綿蘸與之如嘔加木瓜丁

香

雀糞丸

一名透痛丸出聖惠方

治小兒寒軀啼溫中止痛

雄雀糞

一分

牛黃

半兩細研

赤芍藥

半兩

芍藥

當歸

一分剉微

炒

右搗羅為末煉蜜和丸如麻子大百日兒每服以乳汁下一丸日三服量兒大小以意加減服之

茱萸散

出危氏方

治小兒腎縮乃初生受寒氣有此症

右用茱萸硫黃各半兩為末研大蒜薄傅其腹仍以蛇床子燒烟熏之

猪腎當歸散

出聖惠方

治小兒五十日以來胎寒腹痛微熱

而驚聚唾弄舌軀啼上視此癰之候宜服此方

猪腎

一具薄切去脂膜

當歸

剉微炒一兩

右二味相和以清酒一升煮至七合去滓每服取如杏仁大令兒嚙之日三服夜一服量兒大小以意加

減良

治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癰矣

出葛洪  
肘後方

右用當歸末一小豆大用乳汁灌之日夜三四度瘥

芎藭丸

出葛洪  
肘後方

治小兒胎寒腹痛大便青

芎藭

黃耆

各三錢

牛黃

研一分

麝蟲

半兩

麝香

研一錢

當

歸

切

芍藥

各半兩

焙



右為末煉蜜和為丸如麻子大每服兩丸至三丸米

飲下早晨晚間各一量兒大小加減

黃耆湯

出聖濟總錄

治小兒胎寒腹中疴痛

黃耆

切

人參

芍藥

各一兩半

當歸

切

甘草

炙

芍藥

各一

兩

右搗羅每服二錢七以水一小盞生薑二片煎至五

分去滓溫三服早晨日午近晚各一

芍藥丸

出聖濟總錄

治小兒胎寒大便青不欲食

芍藥

當歸

切焙

人參

各三分

甘草

炙一兩

右為末煉蜜為丸如麻子大每服一丸以乳汁下早晨日午近晚各一服量兒大小加減

衣中白魚摩方

出聖惠方

治小兒胎寒腹痛汗出

衣中白魚

二十枚

右以薄熟絹包裹於兒腹上回轉摩之以瘥為度

梨汁飲

出千金方

治小兒忽患腹痛天矯汗出名胎寒

右以煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

當歸散

出傳氏活嬰方

治胎寒啼哭

當歸

錢一

桂心

錢一

甘草

錢半

白茯苓

錢二

右為末每服一錢或半錢乳汁調入口中

五加皮散

出傳氏活嬰方

治胎寒身軟

當歸

錢二

甘草

錢半

木香

錢二

白茯苓

錢三

右為末每服半錢棗湯下或東瓜仁湯下

治胎寒喉中白膜口瘡

出傳氏活嬰方

黃連

硼砂

甘草

各等分

右為末用乳汁調滴入口中猪乳汁亦可

人參散

出傳氏  
活嬰方

治胎寒

人參

當歸

白茯苓

白芍藥

川芎

甘草

各等  
分

右為末每服半錢乳汁調入口中

小柴胡湯

出傳氏  
活嬰方

治胎病寒邪

柴胡

二兩

黃芩

人參

半夏

各三錢

甘草

半兩

右件咬咀每服一錢薑棗湯服

胎熱附論

小兒受胎熱因母受熱或恣食酒麪熱毒之物傳入胎中  
令兒生下面赤眼閉不開身體壯熱哭聲不止口熱如  
湯乃為胎熱之候也 初生嬰兒以表用藥凡有胎熱  
証當令乳母服藥不可求速效也治法當以酸乳令兒喫  
漸次解之百無一失若遽以冷藥攻之必損脾胃加以  
嘔吐乃成大患學者當曉此理胎熱生下有血氣時叫  
哭身壯熱如茶色目赤大便赤黃糞稠急食乳浴法主

之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

方

地黄湯 治在胎受母熱毒生下遍身面目俱黃身熱  
大便秘小便黃色多啼不食乳

赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 猪苓 赤茯苓

苓 澤瀉 甘草 山茵陳

各等分

右咬咀生地黄煎子母同服

解胎熱釀乳方

出危氏得效方

解胎內受熱生下面赤眼閉大

小不通不食乳

澤瀉

二兩半

赤猪苓

去黑皮

天花粉

各一兩半

生乾地黄

二兩

山

茵陳

用葉

甘草

各一兩

赤茯苓

一兩半

右咬咀每服五錢水一盞煎至六分食後撒去舊乳

去滓服

急風散

出醫方妙選

治胎氣挾熱亦因母有邪熱傳染或生

下洗浴當風襦褌失度致令嬰兒啼聲不出乳哺艱

難名曰撮口不開病在七日之內尤甚宜用

蛇蛻皮

一分  
微炒

鈎藤

一分  
乾

蜎稍

一分  
硃砂

麝香

半錢

真牛黃

半錢  
研細

右為末每服一字取竹瀝一兩點同乳汁調下

黃連散

由洗兒洗目不淨穢汁浸漬或在母食熱服

熱藥令兒目赤爛

杏仁

黃連

黃栢

當歸

赤芍藥

各等分

右剉乳汁浸一宿晒乾為末每用一字生地黄汁調

頻點眼中母服洗心散



猪苓湯

右加天花粉山梔仁白水煎臨熟入生地黃汁子母俱服

胎驚附論

胎驚者兒在母胎中十相具足或妊婦驚怪顛撲失驚而心至血脈應之於胎故生下未滿月而發驚者是也初生嬰兒難以用藥凡有此候急令用取猪乳細研辰砂牛黃少許調抹口中功效不可具述又入麝香當門

子尤佳

方

龍膽湯

出直指方

治胎驚月內氣盛發熱凡臍風撮口壯熱

皆可用

龍膽草

鉤藤

柴胡

黃芩

北梗

赤芍藥

茯苓

甘草

炙各半兩

蜣螂

二枚去翅足炙

大黃

一分濕紙煨

麥門

冬

去心一錢

防風

一錢

右為末每服一錢匕棗煎服或加防風麥門冬以導

心熱黃芩減半用三因引用蜨娘餘藥並同

太一散

指出直指方

治胎驚

天漿子

去殼微炒

南星

白附子

各微炮

天麻

防風

茯苓

各二錢

全蝎

硃砂

各一錢

麝香

少許

右為末每服半錢乳汁化下

參蜺散

指出直指方

治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

硃砂

全蝎

天麻

蟬殼

各等分

麝香

少許

右為末煉蜜九梧桐子大每服三九金銀湯下

獨活湯

指出直指方

治胎驚發散風邪

羌活

獨活

檳榔

天麻

麻黃

去節

甘草

各半分炙

右剉散每服半錢水煎服於內加南星末蜜調可貼

顙上

猪乳膏

指出直指方

治胎驚最妙

琥珀

防風

各一錢

硃砂

半錢

右為末猪乳調一字拭入口中

全蝎散

出直指方

治諸驚胎癇

全蝎

焙一箇

琥珀

硃砂

各少許

右為末每服一字麥門冬煎湯調下

全蝎散

出湯氏寶書

治驚胎風皆可服

右以全蝎頭尾全者用生薄荷葉裹外以麻纏火上炙燥為度研為末另研硃砂麝香少許煎麥門冬湯下

牛黃猪乳膏

出危氏方

治兒在胎中受驚初生未滿月而發

驚

右用硃砂細研同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口  
中入麝香當門子尤妙此法諸家方書並皆不曾載  
自余傳之始東官吳觀察新得一子有一月病此因  
用之

牛黃散 治小兒胎驚及乳癰心熱

牛黃

研半兩

馬牙硝

研

鐵粉

研

龍齒

研各一分

右研細和勻每服一字七熱熱水調下早晨午間臨

卧各一服随兒大小以意加減

胎風 附論

夫胎風者由在胎之時臟腑未具神氣未全母動靜不  
常酒色過度或憂愁思慮叫喚聲高或自聞大聲傷動  
心神又因將養失宜觸冒寒暑腠理開洩風邪所傷入  
於胞中兒生之後邪氣在臟不能宣通或包裹失度冷  
觸臍帶風傷四肢若乳哺不調令兒吐噎時復面青或  
痰食壅積則生氣壯熱時或面紅二者不已致令拘

急驚卧不安手足動搖身反強直乍靜乍動此即胎癇也 子在胞胎稟受不足肝心驚虛及其始生乳養無法觸冒外邪或因斷臍瘡痂未斂風邪一入則令臟腑虛弱經絡不通蘊結為熱蓋風善行而數變入於榮衛氣血間則令兒壯熱吐衄精神不寧睡卧饒驚手足抽搐故名胎風縱而弗治則成癇矣

方

葛根湯 治小兒初生至百晬前後驚癇連發不醒及



胎中感風體冷面青筋急反張

葛根

剉微炒

麻黃

去節

羌活

去蘆頭

甘草

炙剉

枳殼

去瓢麩炒各半

杏仁

兩雙

湯浸去皮尖炒一分

升麻

黃芩

去黑

大黃

剉炒各

柴胡

去蘆

芍藥

各三兩

鈎藤

一分

蛇蛻

微炙三寸

蚱蟬

三枚去翅微炒

石膏

碎一兩

右搗篩每服一錢水半盞煎至三分入竹瀝少許更

煎一兩沸去滓分溫三服隨兒大小以意增減

犀角丸

出聖惠方

治小兒胎風搐搦筋脈拘急牙關或時緊

硬

犀角屑

半兩

白花蛇

一兩酒浸去皮骨炙令黃

天南星

半兩炮裂

白附

子

半兩炮裂

乾蝎

半兩微炒

天麻

半兩

麻黃

半兩去根節

以上七味搗羅為末用無灰酒二大盞攪令勻於慢火上煎旋添酒不住手攪以酒盡為度

又方

牛黃

一分麝香

半分膩粉

一分硃砂

一分虎睛

一對微炙

水銀

一分

以棗穰研令星盡

龍腦

一分

右研入酒煎膏內看硬軟和丸如菽豆大不計時候  
以竹漚下三九量兒大小加減

水銀丸

出直指方

治胎風壯熱痰盛翻眼口噤能下胎中蘊

受之毒亦治驚積但量用之

水銀

一錢蒸棗內研成泥

白附子

一錢半

蝎

一錢

南星

硃砂

各一

分

天漿子

牛黃

蘆薈

各半

腦

一錢半

字鈎霜

半錢和

麝

半錢

直僵蠱

炒七箇

右為末粟米糊丸芥子大每一丸薄荷湯下如未通

利加至二丸

虎睛丸

治小兒胎風

虎睛

研

牛黃

研

乾蝟

七枚炒

墨

一棗大

青黛

研一分

史君

子

十枚燒存性

丹砂

麝香

研各半錢

龍腦

研

金箔

銀箔

各十片

右為末用水浸炊餅和為丸如櫻桃大煎金銀薄荷磨下半丸如疾甚重服更量兒大小加減

龍腦散

治小兒胎風及慢驚腹瀉多睡化涎解熱

龍腦研麝香研白附子牛黃天麻白僵蠶

直者妙

乾蝎炒烏蛇肉

酒浸炒各一分

麻黃

去節半兩

天南星

微炒

半兩

右除龍腦麝香牛黃同研令勻外餘搗碎不羅用新  
水一盞浸一伏時冬月浸兩伏時生絹濾藥汁和寒  
食白麵為丸如大皂子大陰乾搗羅為散入前三味  
再同研勻每服一字七薄荷湯調下量兒大小加減  
露蜂房丸 治小兒胎中久積風熱發歇手足搐搦多

驚不睡 出聖惠方

露蜂房

半分炒黃色

蠶蛾

半兩微炒

天漿子

三十枚微炒

天南星

半分

炮裂硃砂

半兩細研水飛過

乾蝎

一分微炒

膩粉

一分

牛黃

一分細研

水銀

一分以棗肉研令星盡

右為末都研令勻以煉蜜和丸如菰豆大不計時候煎槐柳薄荷湯下五丸量兒大小以意加減

水銀丸

出聖惠方

治小兒風發作抽掣渾身急強眼目反張

水銀

天麻

天南星

炮裂

白附子

炮裂

乾蝎

各一兩微炒

兩

麝香

研細

龍腦

研細

藿香

各一分

直殭蠶

一兩

微炒

右為末先用少許棗肉研水銀星盡與諸藥同研令

勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研三丸

服之量兒大小以意加減得汗出立効

虎睛丸

出聖惠方

治小兒胎風及驚風目睛上視手足搐搦

虎睛

一對酒浸微炙黃

天麻

乾蝎

微炒

烏蛇肉

炙微黃

羌活

獨活

殭蠶

微炒

麝香

各一分

細研

右為末以麵糊為丸如菉豆大每服三丸破研不計

時候以薄荷湯服之一方名虎睛膏金箔為衣

天南星丸 治小兒胎風壯熱癰瘰

天南星炮二枚 白附子炮十枚 乾蝎全者炒一分 牛黃研 龍

腦研各錢一 丹砂研一錢半 雄黃研一錢 天漿子十枚去皮

右為末煉蜜和為丸如皂角子大以丹砂為衣三二  
歲兒每服一丸至十歲服三丸煎金銀薄荷湯化下  
空心臨卧服

虎睛丸 治小兒胎風服犀角丸後宜服



虎睛

微炙研一分

代赭

搗研一分

蘆薈

研三分

丹砂

研一分

麝香

研一分

牛黃

研三分

桃仁

二七枚湯去皮尖炒

當歸

切焙一分

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸四

五歲兒每服五丸並溫水下日再

牛黃丸

出聖惠方

治小兒胎風手足搐搦偏身壯熱

牛黃

一分細研

水銀

一分用黑鉛一分同結為砂子細研

硃砂

一分細研

犀角

屑

一分麝香

半分細研

蝎稍

一分微炒

天漿子

一分

天南星

一分炮裂

右為末以糯米飯和丸如菽豆大不計時候以薄荷

湯化破三丸服之量兒大小以意加減

牛黃散

出聖惠方

治小兒胎風驚熱搐搦心神煩亂或渴

牛黃

半分細研人參

半兩去蘆頭

硃砂

半兩細研

珍珠末

一分甘

草

半兩炙微赤剉

鬱金

半兩

川大黃

半兩微炒

胡黃連

半兩

右為末都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒

大小以意加減服之

斷癰丸

出御藥院方

治小兒胎風久為驚癰時發時愈

蛇蛻

微炙三寸

蟬蛻

四枚去上炒

黃耆

剉細辛

細辛

去葉

鈎藤鈎

子

甘草

炙剉各半兩

牛黃

研半錢

右為末再同和勻煮麵糊和丸如小豆大百晷內小兒服三九三二歲兒十丸至十五九人參湯下不計

時候

硃麝散

指出直指方

治胎風心熱痰壅

人參

硃砂

各一分

牛膽南星

天竺黃

牙硝

鐵粉

各半分

麝香

少許

右為末每服一字生薑薄荷湯下

牛黃散

一名人參散

治小兒胎風驚熱痰涎停滯身體強直

眼目反張

牛黃

研一分

天竺黃

研

鉛霜

研各半兩

馬牙硝

研一兩

人參

半兩 丹砂

研一分

右為末再同研勻每服半錢七薄荷湯下量兒大小加減一方有甘草

水銀丸

出聖惠方

治小兒胎風四肢驚掣痰涎壅滯宜服

水銀

半兩黑錫半兩同結作砂子

天麻

半夏

湯洗七遍去滑

鬱金

白附子

各一分  
炮裂

乾蝎

一分  
微炒

右為末以飯和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯下  
量兒大小加減

定命丸

治小兒胞胎氣虛既生觸冒外邪名曰胎風

令兒壯熱神昏多驚掣縱

蟾酥

一錢乾者  
酒浸一宿 乾蝎 七枚炒

白附子

炮為末  
半分

天南

星

炮為末  
一分

麝香

青黛

各一分

右研細以粟米粥和丸如菉豆大別以青黛為衣如

新生兒用膩粉二捻生油三兩點新汲水茶脚化藥  
一粒服下取胎受諸驚熱即更不患驚重者荊芥薄  
荷湯化下一粒服藥後睡困無礙但有患者先化半  
丸滴入鼻中急嚏者必瘥

天竺黃散

出聖惠方

治小兒胎風驚熱手脚急強

天竺黃

一分  
細研

牛黃

半分  
細研

胡黃連

犀角屑

天麻

各一分

蟬殼

一分  
微炒

右為末都令勻不計時候以新汲水調下一字二歲

以上加藥服之

天竺黃丸

出聖惠方

治小兒胎風搐搦壯熱多驚

天竺黃

細研

天南星

各半兩  
炮裂

鉛霜

一分  
細研

胡黃連

半  
分

黃

一分  
細研

右為末研入牛黃等令勻用棗肉和丸如菉豆大不計時候以乳汁研破三丸服之量兒大小以意加減如三歲以上用酒及荊芥湯下

乾蝎散

治小兒胎風發熱驚搐

乾蝎

炒去土

楓香脂

研各一分

白芥子

五十粒

阿魏

研一錢

白

殭蠶

十五枚炒

右為末散再和勻每服一字七不計時候煎薄荷湯

調下量兒大小加減服之

丹砂散

出聖惠方

治小兒胎風心熱驚癇

丹砂

牛黃

天竺黃

鐵粉

各一分

麝香

半分

右研勻細每服半錢以竹漚調下不計時候量兒大

小以意加減



聖惠蚘蚥散

一名乾  
蚘散

治小兒胎風驚搐搦狀如天癇宜

服

蚘蚥

即乾蚘  
微炒

白膠香

各一分

白芥子

五十粒

阿魏

半分  
研入

白殭蠶

十五枚  
微炒

右為散不計時候以薄荷酒調下量兒大小加減服

之良久微汗出瘥

牛黃丸

出聖  
惠方

治小兒胎風手足抽掣宜服

牛黃

天竺黃

羌活

麝香

各一分

蚘

二枚頭  
尾全炒

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒不計時候以薄荷湯下三丸三四歲兒每服五丸量兒大小以意加減次服前虎睛丸

犀角丸 治小兒胎風

犀牛角尖

鎔

牛黃

研

黃連

去

代赭

各一分

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸用乳汁研化三四歲兒每服五丸次服前方虎睛丸量兒大小加減

倍輕散

出經驗良方

治小兒胎風瘡

右用猪腰子一箇開作二片去膜心將五倍子末用輕粉納入腰子內用沙糖和麵固濟腰子縫炭火上炙焦為末清油調塗

皮鞋輕粉散

出經驗良方

右用舊皮鞋面燒灰為末輕粉少許濕瘡乾傳乾瘡油傳

松鼓散

出經驗良方

治小兒頭瘡爛名胎風瘡

右取古老松樹上自脫薄皮豆豉少許瓦器中同炒存性為末入輕粉油調塗

烏雄散

出經驗良方

治小兒胎風瘡

右用烏柏樹根水邊者晒乾為末雄黃生用油調傅之

水銀丸

出聖惠方

治小兒天癆多驚搐搦眼忽戴上吐逆夜

啼徧身如火面色青黃不食乳哺並無情緒

水銀

一兩煮青州棗肉同研水銀星盡

天南星

半兩半生半炮

白殭蠶

半兩 乾蝸 一分 生用 牛黃 一分 生用 麝香 一分 生用 白附子 半兩 生用 鉉霜

兩半

右件藥除水銀膏牛黃麝香鉉霜三味研令如粉餘  
四味搗羅為末都研令勻用水銀膏和丸如粟米大  
一二歲兒每服用薄荷湯下三丸三四歲兒每服五  
丸不計時候量兒大小以意加減服之

硃砂散

出傳氏  
活嬰方

治胎風驚搐心神驚悸眼目直視

硃砂

天竺黃

牛黃

鉛霜

麝香

甘草

鐵朶粉

各等分

右為末薄荷湯調下

牛黃散

出傳氏活嬰方

治胎風手足搐搦口眼喎斜

天麻 牛黃 犀角 蟬退 甘草 天竺黃

胡黃連

各等分

右為末棗肉為丸如菉豆大荊芥湯下

驚藥

出傳氏活嬰方

治風身軟弱啼叫手足微腫

殭蠶 天麻 全蝎 白附子 防風 羌活

甘草 白茯苓 蟬花 麝香 硃砂 山藥

金箔 鈎藤 遠志 茯神

各等分

右件為末每服一錢或半錢燈心薄荷煎湯點服

附子散

出傳氏活嬰方

治胎寒風症頭項軟弱

附子 白芨 百合 川烏 南星 柏子仁

五加皮

皆生用各等分

右為末用好酒塗頭項上乾即便再用又治小兒中風死去四肢厥冷口內涎流眼目喎斜身手反張用

鈎藤煎兩服灌之或得甦省如有此症當急治之

胎黃 附論

凡小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如澁汁飲食不思啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此症乳母宜服生地黃湯仍忌酒麵五辛之物

方

生地黃湯

出湯氏寶書

治小兒生下胎黃狀如金色身上壯



熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候也  
皆因母受熱而傳於胎也凡有此症乳母宜服并畧  
與兒服之

生地黃乾

赤芍藥

川芎

當歸

瓜蒌根

各等

分

右咬咀每服五錢水一盞煎至六分去粗產婦亦可  
服抹些入兒口中

甘豆湯

出湯氏  
寶書

治小兒生下胎黃

黑豆

用一合

甘草

一兩切

右用水一大碗煮臨熟入沙糖少許同糖煎化澄清  
喂飲之加淡竹葉一握能解五臟熱毒夏月產者尤  
宜服之

黃龍湯

出傳氏活嬰方

治嬰兒出胎血肉未斂面目俱黃不啼

鼻乾撮口四肢不伸縮並宜服

山茱萸 山藥 生乾地黄 澤瀉 赤茯苓

甘草

各一錢

腦子

麝香

少許

右為末每服一錢溫水點服如小便不通則用五苓散加人參加茵陳煉燈心煎服

變蒸附論

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日

大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大  
蒸小兒自生三十二日一變再為一蒸凡十變而五小  
蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小  
兒所以變蒸者是容其血脈改其五臟故以一變竟輒  
覺情態有異有變蒸之候變者上氣蒸者體變蒸有輕  
重其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚  
目珠子微汗出其重者壯熱而脈亂或汗或不汗不欲  
食食輒吐喎目白睛微赤黑睛微白又云目白者重赤

者微變蒸畢目睛明矣此其證也單變小微兼蒸小刺  
凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後期五  
日為十日之中熱乃除兒始生三十二日一變二十九  
日先期而熱便治之如法至三十六日七蒸乃畢耳且  
變蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒蒸變或早或晚不  
如法者多又初變之時或熱甚者遠日數不歇審計變  
蒸之日當其時有熱微驚慎不可治及灸刺但和視之  
若良久熱不可已少與紫丸微下熱歇便止若於變蒸

之中加以時行瘟病或非變蒸時而得時行者其証皆相似惟耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之兒變蒸時若有寒加之即寒熱交爭腹腰夭糾啼不止者熨之則愈也變蒸與溫壯傷寒相似若非變蒸身熱尻亦熱耳熱此乃為他病則可餘治審是變蒸不得餘治也 凡小兒生三十二日始變變者身熱也至六十日再變變且蒸其狀端正也至九十六日三變定

者候丹孔出而泄至一百二十八日四變變且蒸以能咳嗽也至一百六十日五變以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五機已成至二百二十四日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸以知欲學語也至二百八十八日九變以亭亭然也凡小兒生至二百八十八日九變四蒸也當其變之日慎不可妄治之則加甚疾變且蒸者是兒送迎月也蒸者甚熱而脈亂汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可

灸刺妄治之也錢氏云小兒在母胎中乃生骨氣五臟六腑成而未具自生之後即長骨脈五臟六腑之神智也他變者易也變蒸者自內而長自下而上又身熱以生之日後三十二日一變每異常情惟異於前伺者長生腑臟智意故生何謂三十日長骨添長神人有三百六十五骨除手中足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段而三十二日計三百二十段為一遍亦曰一蒸骨之餘氣自臍分入鬲



中作二十二齒而齒有不及三十二數者乃變不足之  
常也或二十八日即至長二十八齒已下倣此但不過  
三十二數也凡一周變乃發虛熱也諸病如此十周則  
蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三  
十二日一變生腎至六十四日再變生膀胱其發耳與鼈冷腎  
與膀胱俱主水水數一故先變生之九十六日三變生  
心喜一百二十八日四變生小腸而發汗出而為驚心  
為火火數二一百六十日五變生肝一百九十二日六

變生膽其發目不開而赤肝主木木數三二百二十四  
日七變生肺聲二百五十六日八變生大腹其發膚與  
聲不汗肺主金金數四二百八十八日九變生脾智三百  
二十日十變生胃其發不食腸痛而吐乳此後乃平

方

龍膽湯 治小兒初生血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣  
發熱大吐哕者若已能進哺飲食不消壯熱及變蒸  
不解中客人魘氣并諸驚癇悉療

龍膽

鉤藤

柴胡

去苗

赤茯苓

去皮黑

桔梗

炒

黃

芩

去心黑

芍藥

大黃

剉炒各一兩

甘草

炙剉

蜨娘

去翅足炙

當

歸

切焙

人參

各一兩

右麤搗篩一二歲兒每服一錢七以水五分煎至三

分去滓溫服三四歲兒每服一錢七水一小盞煎至

五分去滓連下三四服量兒大小加減

惺惺散

出傳氏活嬰方

退變蒸及溫壯病輕宜服發熱咳嗽痰

涎鼻壅聲重

人參 白朮 白茯苓 甘草 白芍藥 天花

粉

桔梗

各半兩

細辛

一分

右為末每服一錢水半小盞薑一片薄荷一葉煎至三分服之或除天花粉加川芎或加花粉升麻柴胡等分一方無白芍藥

調氣散

出直指方

治變蒸吐瀉不乳不啼

木香 香附子炒去毛 人參 厚朴 橘皮 藿香

土甘草

各一錢

右劉散每服三字水一盞生薑三片紅棗一枚煎溫服以上證候治之但當以平和之劑微表熱實者微利之

柴胡湯

一名人參散  
出聖惠方

治小兒變蒸經時不止挾熱心煩

啼叫不歇骨熱面青

柴胡

去苗

甘草

炙判

人參

元參

龍膽

半兩

麥門冬

去心

焙一  
兩半

右麤搗篩每服一錢半水八分煎至四分去滓溫服

不拘時更量兒大小加減一方用防風無元參

清心湯

出醫方妙選

治嬰兒周晬內時或體熱眠睡不寧乳

哺目睛不明或瘡或作三十二日一變六十四日再

變甚者微驚乃長血氣名曰變蒸候過周晬漸除切

不可亂投諸藥宜用

人參

半兩去蘆

麻黃

去節

川大黃

麥門冬

去心

甘草

炙

犀

角

用角各一分

石為細末每服一錢水八分杏仁一箇去皮尖拍破

同煎至四分去滓放溫時時與服

前胡湯

治小兒變蒸熱氣乘心煩躁啼叫不已及骨

蒸煩熱

前胡

去蘆頭

龍膽

甘草

炙

麥門冬

去心焙

人參

各一兩

右麤搗篩每服一錢用水七分煎至四分去滓食後

量兒大小加減溫服

紫砂丹

出醫方妙選

治證與前清心湯同

當歸

半兩焙

硃砂

水飛

木香

人參

各一分去蘆

代赭

半兩研細

水浸一宿澄  
去清水焙乾

右為細末與代赭石研勻入杏仁十枚去皮尖巴豆  
五箇去心膜出油同研勻入麝香半錢拌勻滴水和  
如針頭大每服三粒煎荊芥湯下乳後服

當歸散

出直指方

治變蒸有寒無熱

當歸

二錢

木香

官桂

辣者

甘草

人參

各一錢

右剉散每一錢水一盞薑三片紅棗一枚煎食前服

紫凡

一名紫雙凡  
出聖惠方

治小兒變蒸發熱不止并夾食傷寒



溫壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳則吐覘食癰  
先寒後熱

赤石脂

代赭

各一兩  
醋研

巴豆

三十粒  
去油

杏仁

五十枚  
去皮尖

右為末巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千杵當自  
相得若硬入少蜜同搗之密器中收三日兒服如麻  
子一丸與少乳令下食頃後與少乳勿令多至日中  
當小下熱除若未全除明日再與一丸百日兒服小  
豆一丸以此準量增減夏月多熱喜令發疹二三十

日輒一服佳紫丸無所不療名下不虛入代赭須真者若不真以左顧牡蠣代之一方爛飯杵為丸一歲二丸米湯下

四君子湯 治小兒變蒸時用四君子加茯苓去白朮

人參 茯苓

茯神

各半兩

甘草

炙三錢

右為細末薄荷調下慎不可服驚藥恐冷胃氣

黑散 治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸時而得

時者亦治傷寒退熱

一名黑散子

麻黃

杏仁

各半兩

大黃

六銖

右搗大黃麻黃為散別研杏仁如脂乃細細內散又搗令調和內密器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗以粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之一方為末一歲兒半錢熟水調下一方有甘草薄荷湯下

小紅綿散

治變蒸驚悸自泄

天麻

人參

全蠍

麻黃

甘草

茯苓

白

附 紅花 荊芥 辰砂 麝香 各等分

右為末每半錢薄荷同煎湯溫服

防風飲子 治變蒸驚悸焦啼哕乳手足抽掣

防風 羌活 白附 甘草 川芎 白茯苓

全蝎 人參 各等分

右咬咀為散每服一錢鈎藤同煎

防風散 治變蒸潮熱焦啼哕乳欲生瘡癬

山藥 半兩 白茯苓 半兩 白附 半錢 甘草 一錢 全蝎 一錢 人參

防風

各一錢

右為末散每服一字或半錢鈎藤同煎

溫平驚藥 治嬰兒變蒸潮熱驚悸吐乳泄青夢裏佯啼嬉笑情思憔悴並宜服之

茯苓 遠志 羌活 防風 白附 川芎 天

麻 全蝎 粉草 山藥 硃砂 代赭 麝香

白茯苓

白薇

各等分

右為末每服一字金銀薄荷湯下

天麻四君子湯 治變蒸吐乳泄

人參 白朮 白茯苓 天麻 甘草

各二錢

右為末每服半錢熱湯點服及治慢驚體弱冬瓜仁

棗子湯點服

前胡飲子 治變蒸潮熱煩渴頭痛瘡子沈伏或疹痘

未勻並宜服之

升麻 白芍藥 乾葛 前胡 川芎 甘草

知母 麻黃 苦梗 黃芩

各等分

右為末每服一錢葱白薄荷同煎

白朮散 治變蒸風吐乳自泄

人參 白朮 白茯苓 甘草 藿香 山藥

扁豆

炒各等分

右為末每服一錢熱湯點服

清神散 治變蒸潮熱傷寒兼傷風咳嗽氣急夜啼煩

躁頭目昏沈

麻黃

去節二錢

川芎

五錢

羌活

二錢

防風

二錢

荊芥

苦梗

甘草

各二錢

茯苓

半兩

人參

三錢

右為散每服二錢薄荷同煎

溫臟鈎藤膏

治變蒸驚焦啼

白附

茯神

甘草

茯苓

全蝎

羌活

天

麻

防風

山藥

蟬退

殭蠶

遠志

人參

硃砂

麝香

金箔

各等分

右為末煉蜜為丸鈎藤膏蘇木湯化下

蟬花散

治變蒸風痰潮熱焦啼



蟬花一兩 白茯苓 人參 防風 白附子 甘草

山藥 全蝎 天麻 硃砂 麝香

右為末每服一字金箔薄荷點服

小紅丸 治變蒸潮熱咳嗽多痰吐乳驚悸無時焦啼  
疳腮風痰宜服之

南星 半夏 白礬各二錢 全蝎一錢 巴豆三七粒  
各生 去油

代赭半錢 白附一錢 杏仁二錢 硃砂二錢  
生 炒

右為末爛飯為丸如粟米大每服十五丸葱白薄荷

湯下連進三服立通

洗心散 治變蒸潮熱焦啼煩躁口舌生瘡眼赤熱痛  
並宜服之

荊芥 甘草 防風 羌活 苦梗 黃芩 赤

芍藥 白芷 大黃 山梔子 山藥 川芎

赤茯苓 麻黃

各等分

右為末每服一錢燈心麥門冬煎湯點服

連翹散 治變蒸焦啼驚熱

連翹 荊芥 防風 甘草

右各等分為末散白水煎服

牛蒡散 治變蒸生瘡

防風 荊芥 甘草

各等分

牛蒡子

炒一分

右為末散白水煎服

硼砂散 治變蒸生口瘡

硼砂 豆粉 硃砂

各等分

右為末摻口中

犀角散 治變蒸潮熱焦啼驚悸暴赤眼疾

茯神 茯苓 荊芥 防風 藍葉 升麻 人

參 薄荷 羌活 苦梗 黃芩 山梔子 川

芎 白芷 山藥 山茨菇 赤芍藥 粉草

蟬退 大黃

各等分

右等分為末每服半錢薄荷湯服

驚啼 附論

夜啼脾臟冷而痛也當以溫中藥法以攘之花火膏主

之驚啼邪熱乘心也當安心神丸主之 又有驚啼  
夜啼心腹刺痛啼邪干心痛啼乳食作痛啼十者大同  
小異 又啼而不哭是煩哭而不啼是躁凡初生兒日  
夜煩啼真如有祟或謂熱在心經藥與疎利或謂寒停  
腑臟與服溫煖醫者察而治之乃善也若兒啼哭胃脘  
仰突首反張喜燈者心經有熱宜疎利服三黃丸或洗心  
散加燈心麥門冬子良若兒啼哭頭低身曲眼閉肚緊  
者臟腑留寒宜與溫之胃風湯加黃耆煎效若不識證

候但以蟬蛻二七枚全者去大脚為加硃砂一字蜜調  
與吻立效 小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重  
舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而兒面青口有冷氣肢亦  
冷曲腰而啼此冷證也熱則心躁也而啼面赤小便赤  
口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若重舌  
口瘡則要乳喫口到乳上便啼身額皆微熱急取燈照  
口若無瘡舌必腫也客忤者見人氣忤犯而啼也 如  
陽痛服對證藥不退可與珍珠丸利之再與對證藥治

之陰痛服對証藥不退亦可利之再與對証藥治之立  
効盖有積也 又治法一是邪熱在心本臟屬火復為  
熱所乘故炎上而焦哭其候舌白小便赤者是也宜服  
珍珠散方見客忤門中小便赤澀熱宜導赤散又宜服  
官局紫雪二是恐有祟物所覩但口不能語而驚哭也  
其候兩手虎口俱無脈面變五色者是也玉環集三關  
虎口脈形歌云忽然兩手俱無見定知唐突惡神明宜  
服蘇合香丸仍以絳紗袋盛帶之及燒降真香醋炭薰之

甚則燒符命有德法師遣隔之三是有臟腑積冷或乳母飲食生冷令乳夾冷氣入兒腹遇夜半陰氣又盛或失蓋覆孩兒腹肚疼痛冬尤甚也甚則令大便青白而瀉宜服乳香沒藥等仍用葱白連須煎湯慰洗乳母宜服木香勻氣散宜服麝香散夫驚而有陰陽二證亦有半陰半陽證陰則身體溫涼大便青綠時復驚啼陽則身體發熱精神不定睡中驚啼良由風冷乘之榮衛不調又有身涼大便赤黃而啼者有身熱大便青白而啼是



半陰半陽之證也陰用安寶膏陽用寧眠膏半陰半陽用蘇香丸琥珀散

方

蛇黃散 治小兒風熱驚啼

蛇黃

搗碎研

犀角 鎊

人參

白茯苓

防風

細辛

去苗土 蚱蟬 去翅足

乾蝎

醋拌微炒

丹砂 研

母丁香

山

茱萸

微炒 甘草

炙

右羅為末更研令細一二歲兒每服一字用竹瀝調

服三四歲兒每服半錢七日三服不拘時候

安神散

人參

白朮

白茯苓

各一錢

甘草

二錢

辰砂

半錢

天麻

半錢 茯神

半錢

全蝎

七箇

荊芥

一錢

右為末每服半錢荊芥湯下如未安再用調中散

治小兒驚熱

以犀角磨取汁服

龍齒丸

治小兒夜驚熱

龍齒

白殭鼠

當歸

切焙

芍藥

蝸牛

鈎藤

各半兩

代赭

研

牡蠣

麝香

研

牛黃

研各一分

石搗研細煉蜜和如菉豆大二歲兒三九井花水化

下量兒大小以意加減

牛黃散 治小兒風熱驚啼

牛黃

一分細研

犀角屑

一分

人參

一分去蘆頭

茯神

一分

防風

一分

去蘆頭

炸蟬

一分去足微炒

細辛

一分

伊蜥

一分微炒

硃砂

一分

細甘草

一分炙

微剉

右為散入研了藥更研令勻一二歲兒每服一字用  
竹瀝調服三四歲兒每服半錢不計時候

安神丸 治心虛疴熱面黃頰赤壯熱驚啼神志恍惚  
不寧

麥門冬焙去心 馬牙硝 乾山藥 白茯苓 寒水

石研各半兩 硃砂一兩研 甘草半兩 龍腦一字研

右為末煉蜜為丸雞頭大每服半丸沙糖水化下不  
拘時候

青金丸 治小兒體熱忽發吐逆夜驚多啼或泄或

秘變成慢驚或為疳疾定搐搦癰疳蟲墜涎痰安神

心

龍腦

研麝香

研各一分

墨半錢

史君子

煨二枚

膩粉

一分白

麝

青黛

錢二分

金銀箔各少許

右為末滴井花水和丸如鷄頭大每服薄荷湯化下

半丸

桃紅丸 治小兒驚啼眠睡不穩

丹砂

麝香

研各半錢

白附子

半枚

白殭蠶

半枚

乾蝎

頭尾全炒

一錢 膩粉

匕研

金箔

銀箔

各二片研

右搗研為末水浸炊餅心和丸如菉豆大每服一丸  
金銀薄荷湯化下看兒大小臨時加減

萬金散

嬰兒臟寒稟氣怯弱或多顛解面色青白遇

夜多啼甚者煩悶壯熱神索亦由觸犯禁忌所致此

名夜啼宜用

沉香

一兩

丁香

一兩

人參

一兩

五味子

一兩

當歸

一兩

赤芍藥

半  
兩 白朮 半  
兩 桂心 一  
分

右為末每服一錢用溫水淡漿一小盞煎至五分溫時滴口中立效一方有乳香

清神散 治小兒驚熱啼叫不安

牛黃 研 天竺黃 研 鉛白霜 研 鬱金 麥門冬 去心  
焙

甘草 炙各 一分 人參 半  
兩

右為散每服半錢七人參湯放冷調下乳食後

牛黃膏 治嬰兒睡眠着忽啼哭驚覺面赤口乾若神

崇即非夜啼乃風熱邪氣乘於心臟名曰驚啼宜用

真牛黃 牡蠣 人參 甘草 辰州硃砂 雄

黃 龍腦

右搗羅為細末煉蜜和成膏如鷄頭大每服半粒至一粒薄荷湯化下乳食後

養藏湯 嬰兒在胎之時其母將養一切不如法及取涼飲令過度冷氣入兒腸胃使胎不強致生下羸弱多病俛仰多啼名曰軀啼宜用



川當歸

兩半

沉香

兩半

丁香

兩半

白朮

兩半

桂心

兩半

川芎

兩半

木香

右研為細末每服一錢水八分入生薑二片煎至四分去滓放溫時時滴口中一方無木香

紅輪散

治小兒驚夜啼涎壅心躁并治中暑昏憤

牙硝

寒水石

各一兩

麝香

半錢

腦子

半錢

硃砂

二兩

甘草

右為末周晬兒一字薄荷湯調下

龍角丸

治小兒五驚夜啼及壯熱心煩眠臥不安睡

中或時搐搦

龍角

六壯燭生用

川大黃

各九

黃芩

半兩 蚱蟬 二枚 牛

黃

如小豆五枚

右為末煉蜜為丸麻子大蓐裏兒服三丸隨兒大小

增減

龍齒散 治小兒拗哭夜啼

龍齒

蟬殼

鈎藤

有鈎子者 羌活

茯苓

人參

各等

分

右為末每服一大錢水一大盞煎至六分去滓溫  
熱服

治小兒驚啼發歇不定

真好麝香

右研為末每服清水調下一字日三服量兒大小服  
鈎藤散 治小兒驚啼壯熱心煩不得穩睡宜服

鈎藤

一分 龍膽

一分 去  
蘆頭

犀角屑

一分 茯神

一分 黃芩

一分 甘

草

一分 炙  
微赤判

右為末散每服一錢以水一盞煎至五分去滓量兒  
大小分減頻服之

龍齒散 治小兒驚啼眠卧煩熱不安

龍齒

半兩

麥門冬

半兩 去心焙

赤芍藥

一分

川升麻

一分

川大

黃

一分 剉碎 微炒

甘草

一分 炙微赤 剉

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒  
大小分減頻服之

乳哺兼去風癰

虎睛研細犀角屑一枚黃芩去黑心梔子仁 大黃剉碎

微炒各  
半兩

右除虎睛外搗羅為末再全研勻煉蜜和丸如麻子  
大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小加減一  
二歲用乳汁研破三丸三歲兒每服五丸溫水研破  
下勤服以利為度

赤芍藥散 治小兒初生一年內兒多驚啼不休或不  
得眠卧時時肚脹有侶鬼神所為

赤芍藥

一分桂心

一分白朮

一分甘草

一分炙

川大黃

一分

剉碎  
微炒

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分量兒大小

加減溫服

牛黃丸

治小兒驚啼壯熱少不得睡

牛黃

半兩

牡蠣

一分煨  
為末

川大黃

一分剉  
破微炒

黃芩

一分龍角

一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大滿月兒以乳汁研破服

二九一歲兒以薄荷湯下五丸餘以意加減服之

雄黃丸

雄黃

半兩  
細研

牛黃

半兩  
細研

牡蠣

半兩  
燒為粉

真珍珠末

一分巴豆

三枚  
去皮  
心所出油

右都研為末煉蜜和丸如黍米粒大小兒一月或五  
十日未發時飲服三丸母抱卧炊一斗米頃兒當寢  
身體輕汗出即解一服不解可再服若小兒傷乳不  
安腹中有痰乳當微下如雞子清鳥屎鼻涕勿怪便

住服藥

雷丸浴湯

治小兒寒熱驚啼不安

雷丸

三九

牡蠣

三分

黃芩

三分

細辛

三分

蛇床子

右以水一斗煎取七分去滓分為兩度看冷煖用先  
令浴兒頭勿令水入耳目次浴背膊後浴腰已下浴乾  
避風以粉撲之

真珠丸

治小兒驚啼及夜啼不止

真珠

伏龍肝

丹砂

各一分

麝香

一錢



右研如粉煉蜜和丸如菴豆大候啼溫水下一丸大

小加減

犀角丸 治小兒驚啼不止

犀角屑

半兩

羌活

一分

胡黃連

一分

龍齒

一分

右為末煉蜜和丸如菴豆大每服煎金銀薄荷湯研破三丸服之日三四服量兒大小以意加之

白玉散

白玉

一分半兩

寒水石

半兩

右為末用米醋或新水調塗

千金湯 治小兒暴驚啼絕死或有人從外來邪氣所  
逐令兒得疾衆醫不治

蜀椒

左顧牡蠣

各六銖碎

右酢漿水一升煮取五合每服一合口噪不能服令  
含吐兒吃量兒大小加減服之

黃芩散 治小兒心熱驚啼

黃芩

去黑心 人參 各一分

右為末每服一字匕竹葉湯調下不拘時候服之

柏子仁散 治小兒驚啼狀如物刺

柏子仁

一兩

右研細羅為散一二歲兒每服一字用粥飲調服三四歲兒每服半錢一日三四服更量兒大小加減服之

治小兒驚啼發歇不定

取鷄屎白炒為末以乳服之佳一方米湯服之

又方

用亂髮灰酒服或溫水調下一字去心竅邪血也

又方

用臘月縛猪繩燒灰服之

又方

用蠟皮三寸燒灰着乳頭飲之

代赭丸 治小兒驚啼手足搐搦

代赭生用半兩鐵粉研丹砂研白附子各一錢麝香研龍

腦

研各一字

右細研勻煉蜜和丸如櫻桃大量兒大小加減薄荷

湯化下

治小兒驚啼

用車轄脂小豆許內口中及臍中瘥

治小兒夜啼驚大人因驚失心

以震肉作哺與食之凡畜為天雷所霹靂者是

療小兒驚邪

取胡驚窠多作湯洗浴即除驚邪也

治小兒夜後狂語

用竹瀝每一歲兒連夜一合服令盡之

虎睛丸 治驚啼瘈瘲心神恐悸中風不語角弓反張

或驚悸太甚並宜服小兒三五日進一服大能去驚

安魂魄與青金丹服取效

青黛一錢全蝎五箇

硃砂半錢

麝香

腦子

各一字許

白附

半錢

水銀

半錢 棗同研

僵蚕

半錢 字蟬退

七箇 去大足

右為末細研勻用半夏末煮糊丸好如鷄子大一歲  
兒半丸薄荷湯研化隨大小加減再驚啼又為之鷄  
啼思忖間忽然而啼更用安神散

夜啼附論

夫夜啼者有陰陽兩證陰者臟冷也夜則陰盛與冷相  
搏令臟氣相交擊故作痛而啼陽者臟熱夜陽衰與臟  
相搏熱與臟氣交擊故作痛而啼有冷氣之熱與胎毒  
攻衝亦令夜啼也孩兒夜啼者非是神為祟也蓋因胎

熱伏心陰則為陽相形熱則與陽相搏腹中躁悶是以  
為驚啼也經謂合夜至鷄鳴天之陰陰中之陰也夜為  
陰盛之時凡病在陰者至夜則邪氣盛嬰兒氣弱腑臟  
有寒每至昏夜陰寒與正氣相擊則神不得安靜腹中  
切痛故令啼呼名曰夜啼又有觸犯禁忌亦令兒夜啼  
者當以符術治之 初生嬰兒夜啼多不服藥但禮神  
作懺或書天蒼蒼語於客堂壁上誤小兒疾為甚多設  
有患者必多瘦弱便利青沫非穰可止況兒腹中有痛



即令啼叫也

方

牛黃丸 治小兒夜啼多驚煩熱

牛黃

一分 研入

硃砂

一分 研入

蘆薈

一分 研入

麝香

一分 研入

僵蠶

半兩 微炒

龍齒

一分 研入

當歸

一分 微炒

赤芍藥

一分 研入

一分 蝸牛

一分 麝香 炒令黃

代赭

一分 牡蠣

一分 研粉 燒

右為末研入藥令勻煉蜜和丸如麻子大一月及百日兒每服用薄荷湯二丸半年至一歲兒每服五丸

連夜三服量兒大小加減服

紫蘓子散 治小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣

不得下

一名飲子

紫蘇子

微炒

蘿蔔子

微炒

訶梨勒皮

杏仁

去皮尖  
麩炒黃人

參

去苗

木香

各半兩

青皮

去白

甘草

炙微赤  
各一兩

右為細末每服一錢以水一盞入生薑一錢少許同

煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減

人參散 治小兒夜啼不可噤止

人參

半分去蘆頭

茯神

半分細研

甘草

半分生判

川大黃

半分判碎微炒

蛇黃

半分

牛黃

半分細研

犀角屑

半分

白芥子

半分微炒

石為散每服用水煎柳枝桃枝湯調下半錢頻服效  
量兒大小加減服之

鉤藤散

治小兒夜啼臍冷也陰盛於夜則冷動則為

陰極發躁寒盛作疼所以夜啼而不歇也

鉤藤

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

各一錢

甘草

炙半錢

右為末每服一錢薑棗畧煎服其或心熱而煩啼必有臉紅而舌白小便赤澁之證鉤藤散去當歸木香加硃砂末一錢研和每服一錢木通煎湯調下又有觸禁忌而夜啼者醋炭熏服蘇合香丸急以方術驅之

當歸散 治小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不嘔乳是也

當歸

去蘆頭切焙研

白芍藥

人參

桔梗

陳橘皮

各一

錢不  
去白

右為末水煎半錢時時少與服之又有熱痛亦啼叫  
不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃凡人參湯一  
方雙效散有官桂

五味子散 治小兒夜啼及多腹痛至夜輒劇狀似鬼  
崇

五味子 當歸微炒 赤芍藥 白朮各半兩 甘草炙微

桂心 各一分

右為粗散每服一錢用水一小盞煎至五分去滓量  
兒大小加減溫服醫學發明有茯神陳皮一方無赤

芍藥

蓮心散

治小兒夜啼驚熱

石蓮心

半兩

人耳塞

半錢

乳香

二分

人參

半兩

燈花

一字

丹

砂一分  
別研

右為散每服半字七薄荷湯調下不計時候

黃耆丸

治小兒夜啼不止腹中痞痛一頭乳頭散

黃耆

甘草

炙

當歸

切焙

芍藥

附子

炮裂去皮

乾薑

去

炮各一分

右為末用乳汁和丸如雞丸更入少許麵糊丸如黍米大一月及百日兒每服三丸用乳汁下半年至一歲每服五丸一日三五服量兒大小加減服之

犀角散

治小兒夜啼驚熱

犀角屑

鉤藤

川升麻

各一分

人參

三分

黃芩

一分

甘草

一分炙微赤剉

右為麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量  
兒大小加減服之

羚羊角散 治小兒夜啼及多驚熱

羚羊角屑

一分

茯神

黃芩

犀角屑

各一分

甘草

一分

炙微  
赤剉

麥門冬

半兩去  
心焙

右粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓  
量兒大小加減服之

鈎藤散 治小兒夜啼及驚掣



鈎藤

一分  
龍膽一分  
犀角屑一分  
茯神一分  
甘草一分  
微赤判

右粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減溫服之

芍藥散 治小兒夜多啼不止胃滿氣脹膈中氣逆吐

嘔腹痛

赤芍藥

半兩

桂心

半兩

芍藥

半兩

黃芩

半兩

薯蕷

半兩

右搗細羅為散一月及百日兒每服一字粥飲調下

半年至一歲兒服半錢連夜三五服隨兒大小以意

加減服之效

鈎藤膏 治小兒內吊夜啼軀身叫哭唇面青冷

乳香

用燈心研末

五靈脂

沒藥

當歸

各一錢

麝香

一字

右為末煉蜜為丸如豌豆大百日内兒一丸煎鈎藤湯化下饑服一方以燈花三兩顆乳香湯化下燒蛤灰粉入腦子麝香以鈎藤湯下

乳頭散 治小兒夜啼不止腹中痛

一名黃耆散

黃耆

判

甘草

炙微赤判

當歸

判微炒

赤芍藥

木香

各一分

右為散每服少許着乳頭上因兒喫乳服之

龍齒散

治小兒夜哭不止

蟬殼

去翅足洗塗上

鈎藤

有鈎于者

龍齒

茯苓

人參

各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

桂心湯

治小兒夜啼腹痛狀如鬼崇

桂心

去粗皮一分

五味子

半兩

當歸

切焙一分

枳殼

去穢麩炒

甘草

灸一分

右粗篩一月及百日兒每服一錢七用水半盞煎至

三分去滓分溫二服半年至一歲兒准前作一服不計時候

鈎藤膏 治小兒胎寒胃冷腹肚疴痛夜間啼哭嘔吐

乳食大便瀉青狀若驚搐時有冷汗

薑黃

二錢

沒藥

別研

木香

乳香

別研

各四分

右為末煉蜜和成膏每服三錢小兒一丸如鷄頭子

大煎頭鈎藤化下更量兒大小加減不拘時候

代赭丸

治小兒夜啼腹痛鷄鳴即止

一名壯丹丸

代赭

醋七通  
別研

牡丹皮

芍藥

麝香

別研各  
一分

右為末煉蜜為丸如麻子大一月及百日兒每服三  
丸用薄荷湯下半年至一歲兒每服五丸連夜三四  
服蜜湯亦可

伏龍肝丸 治小兒夜啼

伏龍肝

分一丹砂

錢一麝香一  
字

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸量兒大小加  
減俟夜深煎桃符湯下

芍藥散 治小兒腹痛夜啼

芍藥 芍藥

廔蟲

炙令焦  
各一分

右為散一月及百日兒每服一字七用乳汁調服半  
年至一歲兒每服半錢七連夜四服量兒大小加減  
服之一方溫湯下

石膏散 治小兒夜啼壯熱驚懼

石膏 一人參

龍膏

各半  
兩

右為散每服一錢用水一小盞煎至五分去滓量兒

大小加減溫服之

燈花膏

治小兒夜啼錢氏小方有之謂之燈花膏但

只用一味此方加下二味亦治小便赤口煖有汗仰身而啼

燈花

七箇 礪砂一字 硃砂少許

右研極細以蜜調成膏候兒睡時以少許抹口唇立驗  
只燈花用燈心湯下亦可

芎藭散

治小兒夜啼至明即安寐

芎藭 白朮

防風

各半兩

右治下篩以乳和與兒服之酌量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和服如麻子大一丸兒大能服散者以意斟酌與之粥飲調下亦可一方用人參白朮

蟬硃散 治小兒夜啼

蟬蛻

水洗過

硃砂

白茯苓

各一兩

右為末用鷄冠血并蜜湯調下臨卧服



劉寄奴散 治小兒夜啼不止

劉寄奴兩半甘草一指地龍炒一分

右咬咀以水二盞煎至一盞去滓時時與服

伏龍肝散

伏龍肝 交道中土各一把

右治下篩水和少許飲之

蟬砂散 治小兒驚啼夜熱

右用蟬退十四枚全者去大足為末入硃砂一字蜜

調為丸使吮之

蒜乳丸 治小兒冷證腹痛夜啼

右用大蒜一顆慢火煨熟細切焙乾乳香半錢別研極細丸如芥子大每七丸乳空時以乳汁化下

豺狼骨 治小兒夜啼醫所不治者

豺皮 狼屎中骨

右為燒作末服如黍米許即定一方狼屎中骨燒灰水調服黍米大二枚即定

立效散 治小兒夜啼

乳香一錢燈花七枚

右為末每服半字塗乳母乳頭上令服一方燈心灰

塗與兒喫

硫丹丸 治小兒夜啼

硫黃一分鉛丹炒過

右研水粉以小合子內盛不固濟大火煨令煙盡候冷以竹筒中盛紙彈子封口埋在地下七日取出更

研細用飯丸如黍米大一月及百日兒每服兩丸用冷水下半年至一歲兒每服五丸連夜三四服

蟬花散 治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花

和殼

白殭蠶

直者兩箇炒乾熟

甘草

各一分

延胡索

半分

右為末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下服時食後

一物前胡丸 治少小夜啼

右用前胡隨多少搗末以蜜和丸如大豆每服一

九日三稍加至五六丸以瘥為度

麝香散

治小兒夜啼不止面青腹脹是中客忤

右用麝香一分研細每服一字七清水調服之一方  
乳汁調塗口中即愈

治夜啼

右用青黛細研每服半錢新水調下

觸犯禁忌夜啼

右用蘇合香丸以醋炭熏之及用方術驅之口到乳

上便啼身額必微熱急看口內或瘡或重舌依前口  
瘡重舌類治之其啼自止

治小兒夜啼

右用馬蹄末傅乳上飲止馬骨灰傅乳上與兒飲一  
方取死人朽棺木燒明照之即止

治小兒夜啼

右用烏鷄翼安席下勿令母知一方於臍下書田字  
瘥

治小兒夜啼

右用旣帶懸門上一方取犬頸下毛以絳囊盛繫兒  
兩手立止

治小兒夜啼

一方取明鑑掛於床脚上瘥

治小兒夜啼

大蛇眼睛一隻

右為末散以竹瀝調少許與兒喫一方取荒廢井中

敗草垂戶上瘥

治小兒夜啼

胡粉

右為末每服水調三豆大日三服

治小兒夜啼

右取烏牛糞乾者如手大安卧席下勿令母知子母

俱吉

蟬花散

治小兒夜啼不止狀若鬼祟



右以蟬殼下半截為末初生抄一字薄荷入酒少許調下或者不信將上截為末依前湯調下復啼如初古人立法莫知妙處一方蟬退七箇去大足為末欲止上半夜則用上截燈心七莖煎湯下欲止下半夜則用下截如前煎湯服應神效

治客忤夜啼法

右用本家厨下火柴頭一箇以硃書云吾是九天五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛永不放急急如來

律令柴頭以火燒頭為上書了勿令兒知立在床下  
倚床前脚裏男左女右

治小兒夜啼猪尿浴方

右取屎燒灰以沸湯淋汁浴兒并與少許服之

又方

以日未出時及日午時仰卧於臍上橫紋中屏氣硃  
書作血字其夜即斷聲一方車罔盜取安母卧床勿  
令知

花心散 治夜啼邪熱在心內躁

右用燈花一顆取下塗乳上令兒吮乳一又水調硃砂塗五心

治小兒夜啼

小兒夜啼叫聲連無明無夜不睡眠田牛尋來臍上貼冥冥悄悄自安然

又方

以妊娠時飲食偏有所嗜之物以此哺兒則愈

天麻四君子湯 治小兒夜啼

人參 白朮 白茯苓 天麻 麥門冬 甘草

去心

各等分

右咬咀燈心煎服

當歸散 治小兒夜啼

人參 白朮 當歸 甘草 藿葉

少許桂少許

右咬咀白水煎溫服不拘時候

硃砂散 治小兒夜啼

硃砂 石膏 寒水石 滑石 甘草 各一錢 代赭

石 字一

右為末每服一字燈心薄荷湯送下

安神凡 治小兒夜啼

麥門冬

去心 硝 匙上

白茯苓

山藥

寒水石

各一

字

硃砂

半錢

甘草

一錢

人參

一錢

腦子

少許

石為末煉蜜為丸如鷄頭子大每丸荊芥湯下

治小兒腹痛夜啼

右取樹孔中草著戶上立止

治小兒夜啼符法三道

魘

印此

左右  
貼之

甲

此符臍  
中貼之

魘

貼房  
門上

治小兒驚癇夜啼

以仙人杖安身伴睡良

治小兒夜啼

以猪窠中草安蓆下勿令母知

治小兒夜啼不止

取鷄窠中草安蓆下勿令母知

治小兒夜啼

以井口邊草著母卧蓆下勿令母知

治小兒夜啼

以竈中土及交道土合末以飲兒

治小兒夜啼

以狼屎中骨燒作末服如黍米大許即定

軀啼 附論

夫軀啼者有陰陽兩證陰者有母妊娠之時將養失度  
取涼飲冷不避風寒冷氣入胞傷腑臟兒生之後胎寒  
腹內與正氣相搏令兒腹痛仰蹙而啼其證面白印堂  
黑大便青是也陽者亦母妊娠之時酒食熱物衣厚火  
煨煖衾服熱氣入胞傳兒臟腑兒生之後胎熱腹內與  
正氣相搏令兒腹痛軀身而啼其證面赤印堂青大便  
黃色是也又嬰兒出腹口中胎穢拭除不盡嚙下血穢  
停留臟腑亦令軀啼也



方

養脾丸 治小兒軀啼脾胃虛冷心腹痼痛胸膈滿悶

乾薑炮

縮砂蜜

去皮各一兩

白茯苓

去黑皮半兩

甘草

炙三分

大麥蘖

炒

人參

各半兩

白朮

一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸生薑湯化下  
不計時候乳母亦可加數丸服

養臟湯 治內痼軀啼挾冷作痛內痼一方名痼湯

當歸 沈香 木香 桂

川芎

各半兩

丁香

錢二

右為末每服一錢用薑煎湯食前服一方有白朮無  
木香

牡蠣散 治小兒軀啼腹脹胸滿

牡蠣

炒過  
研

伏龍肝

研

甘草

炙  
剉

蒼朮

剉炒各  
一分

麝香

研  
半

分

右於木臼內搗甘草蒼朮成末次與三味再同研令  
勻每服半錢匕研陳米泔澄清煎竹茹湯調下量兒  
大小增減

紫蘇子丸

治小兒軀啼及一切氣逆心腹刺痛

紫蘇

煉炒

陳橘皮

湯浸去白  
各一兩

高良薑

桂

去麁皮

人參

各半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸米飲或溫酒

化下不計時候乳母可加丸數服

白朮丸

治小兒軀啼脾胃傷風冷心下虛痞腹中冷

胸痛膈逆滿

白朮

乾薑

炮

人參

甘草

炙判各  
一兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸沸湯化下量  
兒大小加減

牛黃丸 治小兒軀啼不止

牛黃

研一分

代赭

煨過研三分

麝香

研一錢

牡丹皮

三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服兩丸溫水下

馬齒礬石丸 治小兒胎寒軀啼驚癇腹脹滿不嗜飲

食大便秘青黃色或有食不可吐下并大人虛冷皆治

之

馬齒礬

燒作灰  
二兩

右為細末以棗肉和丸如菉豆大每服三丸米飲下  
加五丸以意加減以服中溫煖為度

治小兒軀啼驚癇腹滿不乳食大便青色

右用栝子仁為末溫水調二錢

又方

燒猪糞以沸湯淋取汁看冷煖浴兒并與少許服之

治小兒軀啼面色青腹強是客忤卒死大人亦可用

右以新放馬糞一圓絞取汁灌之

盤腸氣癰啼附論

夫盤腸氣癰啼者每發時腹內如蛇盤之狀漉漉有聲  
由乳母妊娠之時憂愁思慮勞役心氣蘊結不散觸入  
胎中致生之後胎氣怯弱被正氣相搏令兒作痛其有  
陰陽二證陰則曲身啼而大便青沫陽則軀體而叫大  
便青是二者皆乾啼無淚大便氣洩如兩證交互者是  
半陰半陽也

歌曰盤腸氣發先腰曲無淚叫啼眼乾哭口開脚冷

上唇烏

鳳經云上唇乾云體口乾腸冷胃又乾

額上汗流珠碌碌

水

為冷氣所薄致使痛發腰曲為腸結痛也當溫小腸則痛住次經云上唇乾脚冷月又乾

又歌

曰痛來難忍便身黑體硬如弓一向張如婦胎中傳

邪毒醫人何不用明方

此候氣在小腸結却不伸只將寬氣檳榔散服并與白丁

香膏煎葡萄香散相兼服必愈不可悞吃他藥吐瀉傷寒衛但只和氣

小兒有患盤腸非暴所得由元氣鬱久不散榮衛壅積

五臟六腑無一卻暢其氣乘虛發動滾流上下築隘于

腸胃之間有聲汨漚連連其狀如猫吐物視之不忍又有吊腸一證寒氣壅結內不伸舒雖不引氣鼓動臟腑胸堂與臍下上弔促躬曲偃僂就忍冷痛二候既作駭醫驚衆然俱氣所患治法俱同盤腸宜以勻氣散加沉香煎服之無不愈弔腸當用珍珠丸加以沉香乳香煎鈎藤送下微通即瘥然須調氣之劑助其根本方為萬全也

方



茴香散 治小兒盤腸氣痛

茴香炒 木香 黑附子 金鈴子去核用皮 蘿蔔子炒

破故紙炒 白豆蔻煨各等分 檳榔同上各等分

右咬咀每服二錢水半盞入鹽煎服

備急方 凡有此證急煎葱湯淋洗其腹揉其葱熨臍腹間良久尿自湧出其疼已止續次服藥方

乳香 沒藥各少許透明者細研

右用木香一塊於乳鉢內磨水一分盞調煎數沸了

調乳香沒藥此一方只一服取效

白豆蔻散 治盤腸氣痛

白豆蔻仁 縮砂仁 青皮 陳皮 甘草炙香

附子

蓬莪茂

各等分

右為末每服一錢紫蘇煎湯調下一方無甘草

茴香散 治小兒臍下氣塊疝痛

芸臺子炒 蓬莪朮 茴香炒 青皮 甘草各一分 辣

桂 木香

各半分

右為細末每服半錢鹽水調下

蘿蔔子散 治盤腸氣痛

蘿蔔子

炒黃不拘多少

右為末每服半錢辣桂煎湯調下或只入蘇合香丸

或用薑湯調下

乳香膏 治小兒盤腸氣癰軀身啼叫面紅青黑不定

大便青白妳片不化

附子

炮二錢

乳香

當歸

各一錢

麝香

沈香

各一錢

石為末酒糊為丸如小豆大月內兒一丸鉤藤湯下  
或米飲食前大小加減用之三歲兒二丸

鉤藤膏

治嬰孩小兒盤腸氣癰腹痛叫哭

乳香

細研

沒藥

木香

炮

薑黃

各一錢

木鱉子

三箇

右為末煉蜜和膏收砂罐內每服旋丸如皂角子大

煎鉤藤湯化下一丸日三服次服魏香散

見本後

木香散

治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫

尿如米泔

川棟子

七箇去皮核用巴豆三十五粒  
去皮同炒巴豆黃去巴豆不用

木香 熟

史君子肉

延胡索

茴香

各一分

右用為末清米飲空心調下量兒大小服之

宣連丸

治盤腸氣痛

宣連

雷圓

各一分

木香

二錢  
炒

右為末粟米飯和丸如麻子大每服十九飯飲下

巴附丸

治小兒盤腸緣因懷子在腹中時或因其母

喫冷物太多或胎中帶不淨入孩子腹中每至夜深

則陰氣逼令小兒腹中冷氣疼啼哭不止故為盤腸氣也

大附子尖

不可長半寸去皮炮製為末

斑蝥

一箇去背及足翼只用肉先以銅器

炒熟巴豆

一粒去心膜并殼將巴豆肉乳汁爛研成膏用竹紙一幅重疊裹之以竹捍令油在

紙上直至桿得巴豆油去盡為度

右研極細以麵糊為丸如粟米大每服五丸以少許茴香畧借氣切不可多用也菖蒲茴香湯下臨夜服只通使一服新修合者未可用藥修合百日後通用也

此藥脩合下經年歲轉妙唯小兒盤腸氣最佳

延胡索散 療小兒初生盤腸刺痛面青色啼哭不止

延胡索一錢 乳香 木香各半錢

石為細末水一大盞煎七分無時與服少許

檳榔丸 治小兒盤腸氣痢

麻逸檳榔 大腹子 紅丹香匙

右等分為末麵糊丸麻子大三歲已下小麻子大每服十九粒蘿蔔煎湯下三日燈心湯三日霹靂湯下三

日其湯用薑錢十片水一盞燒秤鎚浸水候沸止溫  
去鎚將此下藥號霹靂湯

魏香散 治盤腸氣痢

真阿魏

錢一 蓬莪朮 半兩

石先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為細末  
每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

越桃散 治小兒盤腸氣痢痛

越桃

去殼半兩入草烏  
少許同炒去草烏

白芷

錢一



右為末每服半錢或一錢炒茴香青葱白酒下

安息香膏 理盤腸氣痢內痢蟲痛外疝但諸般心痛

皆治

安息香

桃仁

湯去皮尖  
麩炒黃

蓬莪茂

溫紙  
裹煨

史君子

取  
油

切焙乾秤以  
上各半兩

乾蝎

一分阿魏

錢一茴香

三錢  
炒

右除桃仁別研外次以阿魏并安息香以酒少許就

湯瓶口上以盞盛蒸開土砂入桃仁中研餘藥為末

一處煉蜜為膏如皂角子大生薑薄荷湯化隨兒大

小加減

盤腸氣痛 其證偃僂腰曲乾哭無淚額有汗以葱一握水煮以湯淋洗兒腹以葱頻熨臍間良久屎出痛止

驚風內疳啼附論

夫驚風內疳啼者陰陽兩證陰者起於吐衄之後胃氣虛弱精神昏憤嘔不寧或不乳項硬反張手足瘳癎內疳啼也陽者起於身體發熱驚悸大哭精神傷動

恍惚不定或睡或不睡涎鳴氣粗手足潮搐驚癇啼叫也

歌曰癇多啼子細看莫將蟲痛一般言唇涎鼻紫為

蟲痛

一云蟲痛吐涎唇口紫

內癇還須黑色觀但觀紅筋生眼

尾便知風候本根源

四十候云只看眼畔紅筋見有血相點斑

鎮心使藥

方為妙始覺良工按古賢其候寒熱內薄氣血凝滯

蘊結不散腹中痛但調氣去其積熱積冷調毒退愈

宜與生銀丸越桃散宜下此候與蛔蟲候一般唇口紫下竭稍九未安即微下

黑是蟲候自有紅筋手在後胸高是內疔也

方

沉香飲 治小兒驚氣入內疔肚熱肚疼并受胎氣怯

弱冷氣傷脾腹脛啼叫狀若鬼祟腹膨脹面青

沉香 木香 炮 當歸 去 白朮 甘草 炙 肉桂 去 五

味子 枳殼 炒 赤芍藥 以上各等分

右咬咀半歲兒抄半錢水酒各半盞煎至五分去滓

饑服大小加減

辰砂散 治小兒傷冷聚積驚風日久便成內癰發時

人不識呼為祟

硃砂半分紅芍藥

鉛白鎔各一分半琥珀研珍珠不鑽者為

末各一分

右為末每服一字金銀薄荷湯下

斬邪丹 治小兒驚積內癰時發肚疼夜啼驚叫

乳香沒藥舶上茴香炒木香不見火鈎藤各一錢

右為末將乳香沒藥二味乳鉢中細研然後勻諸藥切

大蒜白三片研細和前藥如梧桐子大每服十丸十五丸鈎藤茴香湯吞下無時

乳香丸 其證腹痛多啼唇黑囊腫偃倮反張眼有斑血驚風內癇啼

沒藥

乳香

沉香

各一兩

蝎稍

十四箇

檳榔

一兩半

右為末煉蜜和丸菖蒲鈎藤煎湯下丸如黍米大一  
方無檳榔

乳香丸

治小兒驚風內癇痛不可忍者

乳香

一錢半

蜎稍

二七箇

沒藥

半錢

沈香

一錢半

右為末煉蜜和丸如黍米大嬰孩每服三九一歲五  
九三歲七九以意加減乳香湯吞下

桃符丸 治嬰孩小兒驚風內癇

銀硃

乳香

各一錢

大蒜

一子煨研

右先研乳香極細後入銀硃再研後又同大蒜研看  
軟硬得所丸如菽豆大半歲每服五九一歲七九二  
三歲十九以意加減薄荷湯化下

沒石子丸 治小兒驚風內癇腹痛不可忍

木香

螺粉

研草烏頭

生用去皮

右為末用醋煮糊為丸如黍米大每服十九丸淡醋吞

下

止痛丸 治小兒嬰孩內癇

大鯢子肉

胡椒各等分

右為細末用黑豆末醋作糊丸如菉豆大每服三四

粒荊芥湯下



治內癰腹痛 病源曰驚風內癰腹痛多啼汗出糞青  
咬乳眼慢流涎或唇黑囊腫偃倮反張眼內有紅筋  
斑白虎口脈紋入掌

石以青龍湯奪命丹並用鈎藤鈎子七箇不蛀皂角  
子七粒薄荷七葉煎湯調服

芎歸散 治內癰胎寒腹痛嘔啼

官桂 當歸 川芎 香附子 各一分 川白薑 木

香 甘草 炒各半兩

右為末每服半錢白水煎乳食前服

木香散 治驚風內癇盤腸氣虫痛

黑牽牛末

半生半熟

大腹子

各一兩半

檳榔

雷丸

錫灰

醋炙三棱

莪朮

並煨

木香

大黃

各一兩

右為細末每服三錢空心蜜水或沙糖水調下先用  
燒猪肉一片細嚼不吞仍吐出却服藥引虫

胎寒胃冷啼 附論

夫胎寒胃冷啼者由母妊娠之時寒溫失理動止乖違

取涼飲冷冷氣停滯觸入胞中致生之後冷伏脾胃令  
兒咳噎風邪暴傷令兒吐喎面白青形時時啼叫是胎  
寒胃冷故也 小兒胎寒之病本於在胎時稟氣不足  
或犯寒冷既生之後臟腑又怯弱乳哺不化或脹痢顏  
色青葩甚則邪冷與正氣相搏令兒腹痛軀張感氣而  
啼是為胎寒之病

方

蜀椒丸 治小兒胎寒軀啼腹中痛舌上青黑涎下

一名

當歸  
丸

蜀椒

去目及開口者炒出汗一分

當歸

切焙半兩

吳茱萸

湯浸焙下炒半分

狼

毒

剉炒一分

細辛

去苗葉三分

乾薑

炮一分

豉

炒二分

巴豆

十枚去心

膜研細紙裹出油盡附子

炮裂去皮臍三分

右將八味搗羅為末以巴豆一處同研令勻煉蜜為

劑搗干杵和丸一月兒服黍米大一丸早晨晚後各

一服一歲兒兩丸三歲至五歲兒服五丸並用米飲

下更量兒大小加減

當歸散 治小兒胎寒軀啼驚癇虛脹不嗜食大便青

或夾膿并治諸癇症下半年至一歲兒每服五九一

日三五服

乳食作痛啼

附論

夫乳食作痛啼者因兒飲乳乳壅不散傷動脾胃脾氣弱不能消化滯乳停留與正氣交擊故成陣作痛而喘也  
湯氏曰臟寒腹痛由乳母食啖生冷觸冒風寒令乳夾冷氣入而腹中遇夜半陰氣又盛或失蓋覆令兒腹

冷痛或胎中受寒亦令腹痛多啼其證大便青白而瀉  
面白

方

治臟寒腹痛

用四君子湯加丁香白薑每服木香勻氣散五積散

又方

以熟艾烘熱以帛包頻熨臍腹

小兒不喫乳附論

凡小兒初生看產人見兒出急須及時以手掩拭兒口  
無令惡血得入兒喉則兒腹內調和無有疾病若掩拭  
不及時則惡血穢露兒咽入腹令心腹痞滿故兒不喫  
乳也

方

硃砂丸 治小兒三歲已胃口閉不喫乳

硃砂

一分  
細研

丁香

一分  
分

麝香

一分  
細研

人參

一分  
去  
蘆頭

犀角屑

半兩黃耆

半兩  
判

石膏

半兩  
水飛

五靈脂

半兩  
兩

牛黃

一分  
細研

甘草

一分炙  
微赤判

右搗羅為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如菉豆  
大每服以熟水下三九日四五服

龍膽散 治小兒壯熱肚脹不飲乳

龍膽

半兩去蘆頭

犀角屑

一分

川升麻

半兩

川大黃

一分

判碎微炒

甘草

一分炙微赤判

鼈甲

一分令黃去裙襴

炙

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓  
放溫分減漸漸與服之



摩頂膏

白朮

沉香

香附子

訶子

炮去核

木香

檀香

畢澄茄

丁香

犀角

各一兩

麝香

半兩

蘇合香

酒炙成

膏乳香

硃砂

各一兩

腦子

半兩

安息香

酒炙成膏

人參

各一兩

兩

右為末同蘇合香安息香膏八味煉蜜一處為丸如

鷄頭大半歲分作七服人參湯化下饑服

六神散

治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲腰

而啼大便泄瀉青白糞及不吮乳治因身熱服藥既表解後再熱者蓋氣不歸原而陽浮於外故耳此非熱證也當用此藥加粳米煎和其胃氣歸內身體自涼

人參 山藥

白朮

各半兩

甘草

二錢

白茯苓

白扁

豆

炒各一兩

右為末每服一錢薑二片棗一枚煎一方用當歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢為散每

一錢水煎時時與服前藥治胃冷加附子治風加天  
麻治痢加罌粟殼

參香丸 治小兒心腹痛并腸冷便青腹急痛

乳香 木香 石菖蒲 人參 良薑

炒各等分

右為末酒糊丸如小豆大一歲五丸米湯下

蓬仙丸 治小兒心腹刺痛軀身啼哭腸冷便青

桂心 皮乳香

蓬莪朮

炮各一錢

右為末酒煮糊為丸如小豆大一歲三丸鈎藤湯下

饑服

蒜乳丸

治冷證腹痛夜啼面青手冷

大蒜

一枚慢火煨香熟取出細研  
切日中或火上焙半乾研

乳香

半錢別研

右研勻為丸如芥子大每服七粒乳飲空時服以乳  
汁送下

治小兒腹痛夜啼

牛黃

如小豆大

右用乳汁化服又臍下書田字瘥

半夏丸 治小兒腹痛啼呼悶絕

半夏

生薑汁洗去  
滑暴乾一分

右為末用酒麪糊丸如黍米大百日兒每服三丸

治小兒邪祟所侵兒目有所覩而驚哭其候兩手虎口  
俱無脈紋面變五色

右研麝香雄黃硃砂同蘇合香丸降真香湯下

又方

右用熟艾紙上烘熱外以帕子包熨臍腹中作兩包

頻易如大便青瀉宜服錢氏益黃散

蚯蚓丸

治小兒中客忤

一名黃土散

右用淡豉竈中土蚯蚓糞用醋搗和丸如鷄子大摩  
兒顙上及手足心并臍上下各七次擘開藥如有毛  
即棄之

心腹痛啼

附論

夫卒然心腹刺痛叫悶欲絕死者蓋小兒氣血軟弱精  
神不足忽傷賊風遭邪氣中客忤皆虛而得者其証面

易五色眼睛不視似驚癇狀是也無問大小若陰陽順理榮衛和平神守內堅邪不干正無諸暴疾也或腸胃挾冷暴為寒邪所折邪氣分爭攻衝上下亦令心腹刺痛而啼也

方

蘇合香丸 治小兒心腹刺痛啼哭不住或中邪氣或衝客忤或驚氣入腹或夜啼癇痛面色不定常服與少許辟邪氣瘟疫除癇霍亂

人參

乾薑

炮

白朮

甘草

炙各等分

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一盞入大棗一枚擘破同煎至半盞分溫三服以薑棗湯化下  
保嬰方為末每服一錢白湯調下名理中湯無時

當歸酒 治小兒五十日以來胎寒腹痛微熱聚唾弄  
古軀啼上視

當歸

切焙粗

猪肉

一兩薄切小片

右用清酒一碗煮至七分去滓每服取半呷許令兒



嚙之日三夜一量兒大小加減

胎熱伏心啼

附論

夫胎熱伏心啼者由妊娠之時不忌辛酸多食炙燂厚衣煨服熱氣熏蒸觸入胎中致胎下之後熱伏於經令兒恍惚風邪暴傷令兒驚啼面赤唇紅時時啼叫是胎熱伏心故也

方

導赤散 治小兒躁啼面赤小便亦赤口中熱腹上亦

熱或有汗仰身而啼至晚方息

右以導赤散加黃芩煎未效通心飲加麥門冬車前子燈心薄荷湯與兒飲

猪苓湯 治熱在心本臟屬火復為熱所乘故炎上而焦哭其証面赤紅小便赤口氣熱啼時時有汗仰身而啼煩躁畏燈火

右以猪苓湯加辰砂導赤散小柴胡湯加黃芩生地黃並用燈心麥門冬或竹茹煎服

芝燈湯 治小兒熱証心躁夜啼

右以芝蔴清油燈花三兩顆研細用燈心數莖煎湯調塗口中以乳汁送下

邪干心痛啼 附論

夫邪干心痛啼者本非起於心乃邪氣客於心也心為五臟之主精神之舍心氣實則邪不干正心氣虛則邪傷於心

當歸

切焙半兩

蜀椒

去目及閉口者炒出汗一分

附子

一枚炮裂去臍皮

狼

毒

判炒

杏仁

十二枚湯浸去皮尖雙仁麩炒

豉

微炒

巴豆

二十枚去皮心研爛

去油

細辛

去苗葉各一分

盡

右為末煉蜜和杵以瓷器盛之每服旋丸未滿百日

兒服如蘇子大一丸溫水下一二歲兒二丸早晨空心服更量兒大小加減以利為度

楊氏當歸散

治胎寒腹痛面色青白身溫冷腹痛多

啼

當歸

炒

黃耆

蜜炙

北細辛

去苗葉

肉桂

去皮

白薑

炮

縮砂

仁

甘草

各等分炙

摩頂膏

治小兒鼻塞腦悶喫乳不得

羊髓

三兩當歸

三分剉微炒

細辛

三分白芷

三分木通

三分野豬

脂

三兩

右搗碎先下脂髓於鐺中入諸藥以慢火煎候白芷色焦黃藥成以綿濾去滓於瓷合盤盛令凝每用少許塗頂門上摩之兼以少許入鼻內立效

人參丸

治小兒腹痛不食乳

人參

半兩去  
蘆頭

黃連

半兩去  
鬚

龍膽

半兩去  
蘆頭

馬牙硝

半兩

草

半兩炙  
微炒判

枳實

半兩麩  
炒微黃

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以乳汁研

二丸灌入口中曰三五服瘥

乳黃散 治小兒腹痛不止哺乳

赤茯苓

一分甘草

一分炙  
微赤判

黃連

一分  
去鬚

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子每服一丸研破著

妳頭上令兒吮妳或研點口中亦得

硃砂散 治小兒不喫乳眼目不開手足牽挽此是驚

風

硃砂

一分 龍齒一分 消石一分

右細研為散每服煎竹葉湯放溫調下一字如二歲已上兒每服半錢

鹽黃散 治初生兒不飲乳吐不止

蘧莪散

少鹽兩黃米大

右以妳汁一合煎三五沸去滓即加牛黃兩粟米大

分減服之立效

青礞石丸

治小兒吐奶

白丁香

一錢  
去土

硫黃

三錢

青礞石

一錢  
半

百草霜

一錢  
半

五

靈脂

一錢  
半

右為末細研米飯為丸如菽豆大捻作餅子每服三十餅溫水送下

右咬咀生薑糯米煎空心服

當歸散

治小兒胎寒聚唾弄舌軀啼反張怒驚

方見  
本門



胎寒  
類

幼乳法

治中寒其證手足厥冷寒顫口禁暈悶口吐

涎沫不能啼哭

右用五積散薑棗煎子母服一方消積飲加丁香薑

棗煎子母同服一方用食鹽同茱萸炒絹包熨兒臍腹

乳附丸

治小兒腹冷寒胃冷便夾白膿心腹痛洩瀉

氣虛腹痛啼叫有汗

附子

炮去皮

乳香

當歸

訶子

炮去核

桂心

乾薑

炮 吳茱萸

各等分

右為末酒糊為丸如小豆大月內兒一丸鉤藤湯下或米飲食前大小加減服

芎藭湯 治小兒胎寒腹痛軀啼

芎藭

當歸

切焙

黃耆

剉焙各三兩

乾薑

炮

甘草

炙

黃芩

去黑心各半兩

右搗篩每一錢用水一小盞煎至五分去滓溫分二服早晨日晚一服量兒大小加減服之

逐痛丸 治小兒胎寒軀啼溫中止痛

雀屎

一分炒

牛黃

別研

芍藥

芎藭

各半兩

當歸

切焙

一兩

右為細末煉蜜和丸如麻子大百日兒每服一九乳  
汁下早晨日午近晚各一服量兒大小加減

理中丸

治小兒胎寒腹痛軀啼不利方見前

厚腸丸

治小兒失乳以食飼之未有食腸不能尅化

或生腹脹四肢瘦弱或痢腹痛啼

橘皮

三分去白

大麥蘖

五分炒

半夏

三分洗

枳實


三分炒

蒼朮

三錢  
製 青皮 三分 人參 二分 厚朴 二分 薑炙 神麴末 五分  
去穰

右為細末水麵糊為丸如麻子大每服二十九溫水

送下食前忌飽食



普濟方卷三百六十一